




ULS
ESTUÁRIO
DO TEJO

PESQUISA DE GÂNGLIO SENTINELA

CUIDADOS PÓS-OPERATÓRIOS



Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, E.P.E.

Estrada Carlos Lima Costa Nº2, Povos
2600-009 Vila Franca de Xira

Tel: 263 006 500 (geral)

Email: hvfxira@ulsetejo.min-saude.pt

O ORGÃO — MAMA

Trata-se de um órgão localizado no tórax, anteriormente aos músculos peitorais, constituído por glândulas (lóbulos e ductos), gordura, vasos e nervos, sustentados por ligamentos.


A drenagem linfática está a cargo de vasos e gânglios linfáticos localizados na axila. Com a progressão do tumor, geralmente, o primeiro local de disseminação é a axila.

QUE TIPO DE CIRURGIA?

Quando não há gânglios metastizados na axila, está indicada a Pesquisa do Gânglio Sentinela (GS) – o primeiro gânglio a receber a drenagem da mama – a fim de se perceber se a doença já progrediu para a axila.

Realiza-se este procedimento mediante a pesquisa de marcadores radioactivos na axila, infiltrados na areola durante um exame prévio – Linfocintigrafia.

Aquando da identificação do GS, este é removido e enviado para análise posterior. Se for negativo para a presença de tumor não será necessária nova intervenção para remoção de mais gânglios.



APÓS A CIRURGIA

> PRINCIPAIS CUIDADOS A TER

- Evitar conduzir, se for o caso, durante a primeira semana;
- Evitar fazer esforços durante as primeiras 2-3 semanas;
- Seguir as instruções de realização de pensos e eventual remoção de pontos/agrafos;
- Comunicar ao Enfermeiro e/ou ao seu Médico se surgir:
 - Febre ($>38^{\circ}\text{C}$);
 - Aumento da dor local ou edema (inchaço);
 - Outros sinais inflamatórios: calor, vermelhidão ou saída de líquido;
- Comparecer na consulta de reavaliação pós-operatória;
- **Não é expectável ter alterações/limitações/incapacidade permanente do braço.**