

## **Informação ao Utente**

### **Cirurgia de Ambulatório**

#### **Protocolo Analgesia em Ambulatório – Dermatologia (AMB 5)**

O controlo da Dor Aguda Pós-Operatória é um dos aspectos mais importantes para a obtenção de resultados de qualidade no âmbito da Cirurgia de Ambulatório. Apesar de todos os avanços, a dor permanece como o sintoma pós-operatório mais vezes referido, sendo a primeira causa de admissão e readmissão, podendo ainda representar um obstáculo a expansão deste tipo de cirurgia.

#### **MEDICAÇÃO**

##### **Paracetamol 500 mg comprimido**

##### **Como tomar:**

- 2 comprimidos 3x por dia (8/8 horas), com/sem alimentos

Conservar a medicação em local fresco e seco, ao abrigo da luz.

**No caso de persistência de sintomas como náuseas, vômitos, flatulência, dor abdominal, mal estar gástrico, consulte os Serviços Farmacêuticos.**

**Não hesite em contactar o seu farmacêutico**  
**[sfarmaceuticos@hvfx.pt](mailto:sfarmaceuticos@hvfx.pt)**  
**263 006 500 (ext: 64118/64115).**

#### **Equipa farmacêutica**

Diretora: Carla Ferrer

Farmacêuticos: Ana Marta Jorge, Catarina Oliveira, Fábio Glória, Joana Ferreira, José Branco, Mariana Carvalho, Sónia Moreira e Sara Cândido