


Informação ao Utente

Amniocentese

A amniocentese é realizada após as 16 semanas de gestação e consiste na punção da cavidade amniótica por via abdominal, para recolha de líquido amniótico, sob controlo ecográfico.



Neste líquido, existem células fetais em suspensão. O líquido é enviado para o laboratório, de forma a cultivar as células e observar ao microscópio, os cromossomas do feto, com objectivo de excluir anomalias nesses cromossomas. Trata-se de um exame um pouco doloroso, comparando-se a uma colheita de sangue.

INDICAÇÃO:

- Rastreio pré-natal positivo para aneuploidias;
- Idade materna avançada (≥ 35 anos);
- Feto com malformação detectadas na ecografia;
- Filho ou feto anterior com defeitos genéticos;
- Alterações cromossómicas dos progenitores;
- Doença monogénica familiar.

CONTRA-INDICAÇÃO:

- Incompetência cervico-istmica;
- Infecções maternas, ginecológicas e doenças infecto-contagiosas
- Discrasias hemorrágicas

VANTAGENS:

- Avaliar problemas genéticos;
- Determinar o sexo fetal;
- Para estimar a maturidade fetal.

RISCOS:

- Aborto (0,5%);
- Metrorragias ligeiras;
- Perda de líquido amniótico;
- Infecção amniótica

Em casos raros, por questões de ordem técnica, pode não ser possível obter líquido suficiente e em menos de 1% dos casos, a análise do líquido pode fracassar ou não ser conclusiva.

Informação ao Utente

Amniocentese

NO DIA DO EXAME:

- Não deve vir em jejum;
- Deve vir acompanhada de um familiar ou amigo;
- Não pode conduzir e o carro deve ser de 5 lugares;
- Trazer consigo o Boletim de Saúde da Grávida e exames anteriores;
- Se o seu grupo de sangue for Rh (-) e do seu marido Rh(+), é-lhe administrado a Imunoglobulina anti-D (injecção intramuscular) no exame.

APÓS O EXAME:

- Repouso absoluto durante 48h (pode ir ao WC e sentar-se para tomar as refeições)
- Nas 72h seguintes poderá regressar à sua vida quotidiana, mas sem grandes esforços ou pesos;
- Não ter relações sexuais 8 a 10 dias pós exame
- Deve aumentar a ingestão de líquidos;
- Se dor abdominal tomar Paracetamol 1gr;

DIRIGE-SE PARA URGÊNCIA DESTA HOSPITAL SE:

- Febre;
- Perda líquido amniótico;
- Dor abdominal forte;
- Hemorragia vaginal

Um resultado normal não garante que o feto não seja portador de defeitos físicos ou psíquicos, não detetáveis por avaliação dos cromossomas.

Este exame não dispensa da realização das ecografias realizadas por rotina.

O TEMPO PREVISTO PARA O RESULTADO RÁPIDO/ANEUPLOIDIAS É DE 24H/48H ÚTEIS APÓS O EXAME.

O RESULTADO FINAL ESTÁ PREVISTO CERCA 15 A 20 DIAS ÚTEIS APÓS O EXAME.

Se necessitar de algum esclarecimento ou informação poderá fazê-lo telefonicamente entre as 10h e as 16h de segunda a sexta-feira ou dirija-se à Consulta de Obstetrícia ou Diagnóstico Pré-Natal.

Considerando-se esclarecida sobre o procedimento a que vai ser submetida, será solicitado que assine o IMP.GER.005 - Consentimento Informado para Procedimentos Invasivos.

Quaisquer outras dúvidas podem ser esclarecidas pelo seu médico ou enfermeiro.