


Informação ao Utente

Biópsia das Vilosidades Coriônicas

Consiste na colheita de córion frondoso. Realiza-se no 1º trimestre entre as 11 e 14 semanas de gestação. A colheita é realizada através de biópsia das vilosidades coriônicas por via abdominal ou transcervical, dependendo da localização da placenta, com controlo ecográfico.



Estas células colhidas são enviadas para o laboratório, de forma a as cultivar e observar ao microscópio, os cromossomas do feto com objectivo de excluir anomalias nesses cromossomas. Trata-se de um exame um pouco doloroso, comparando-se a uma colheita de sangue.

INDICAÇÃO:

- Rastreio ecográfico alterado (translucência da nuca, ossos do nariz);
- Rastreio bioquímico pré-natal positivo (1º trimestre);
- Idade materna avançada (≥ 35 anos);
- Feto com anomalia estrutural
- Casal com filho ou feto anterior com defeitos cromossómicos;
- Alterações cromossómicas dos progenitores;
- Doença genéticas familiares.

CONTRA-INDICAÇÃO:

- Incompetência cervico-istmica;
- Infecções maternas, ginecológicas e doenças infecto-contagiosas
- Discrasias hemorrágicas

VANTAGENS:

- Realizada precocemente
- Colheita de grande quantidade de material fetal
- Diagnóstico precoce de fibrose quística ou hemofilia
- Resultado imediato

DESvantagem:

- Mosaicismo cromossómico

RISCOS:

- Dor e/ou hemorragia;
- Hematoma subcoriônico;
- Corioamnionite;
- Aborto ou perda fetal

Informação ao Utente

Biópsia das Vilosidades Coriônicas

Em casos raros, por questões de ordem técnica, pode não ser possível obter células suficientes e em menos de 1% dos casos, a análise pode fracassar ou não ser conclusiva.

NO DIA DO EXAME:

- Não deve vir em jejum;
- Deve vir acompanhada de um familiar ou amigo;
- Não pode conduzir e o carro deve ser de 5 lugares;
- Trazer consigo o Boletim de Saúde da Gravida e exames anteriores;
- Se o seu grupo de sangue for Rh(-) e do seu marido Rh(+), é-lhe administrado a Imunoglobulina anti-D (injecção intramuscular) no exame;
- É fornecido um comprimido (Diclofenac) para prevenir as contracções, para tomar depois do exame.

APÓS O EXAME:

- Repouso absoluto durante 48h (pode ir ao WC)
 - Tomar comprimido fornecido (Diclofenac) à hora do jantar, que previne as contracções;
 - Nas 72h seguintes poderá regressar à sua vida quotidiana, mas sem grandes esforços;
 - Não ter relações sexuais 8 a 10 dias pós exame;
 - Deve aumentar a ingestão de líquidos;
 - Se dor abdominal tomar Paracetamol 1gr;
 - Se biópsia via vaginal poderá perder sangue durante 3 a 4 dias.
- Dirige-se para Urgência deste Hospital se:
- Febre;
 - Perda líquido amniótico;
 - Dor abdominal forte;
 - Hemorragia vaginal

Um resultado normal não garante que o feto não seja portador de defeitos físicos ou psíquicos, não detectáveis por avaliação dos cromossomas.

Este exame não dispensa da realização das ecografias realizadas por rotina.

O TEMPO PREVISTO PARA O RESULTADO RAPIDO/ANEUPLOIDIAS É DE 24H/48H UTEIS APÓS O EXAME.
O RESULTADO FINAL ESTÁ PREVISTO CERCA 15 A 20 DIAS UTEIS APÓS O EXAME.

Se necessitar de algum esclarecimento ou informação poderá fazê-lo telefonicamente entre as 10h e as 16h de segunda a sexta-feira ou dirija-se à Consulta de Obstetrícia ou Diagnóstico Pré-Natal.

Considerando-se esclarecida sobre o procedimento a que vai ser submetida, será solicitado que assine o IMP.GER.005 - Consentimento Informado para Procedimentos Invasivos.