

## **Informação ao Utente**

### **Miomectomia Abdominal por Laparotomia**

Este procedimento consiste na remoção de miomas através de uma incisão no abdómen, onde ficará com uma cicatriz que poderá ser longitudinal ou transversal.

Neste procedimento podem também ser detetadas outras situações patológicas não diagnosticadas anteriormente, assim como ocorrerem complicações imprevisíveis ou fortuitas que obriguem à execução de outros procedimentos médicos ou cirúrgicos, que serão decididos de acordo com o julgamento técnico médico e os meios disponíveis.

As principais complicações associadas à miomectomia abdominal são: hemorragia, infeção, perfuração de bexiga ou ansa intestinal, lesão vascular ou ureteral, abertura da cicatriz (pele ou pele e parede abdominal). Embora raramente, em algumas situações de hemorragia uterina não controlável, sobretudo em miomectomias múltiplas, pode ser necessário realizar histerectomia (retirar o útero).

Em procedimentos médicos invasivos, como o citado, podem ocorrer complicações gerais como problemas cardiovasculares e respiratórios.

Por norma, para este tipo de intervenção é necessário reservar sangue que só será utilizado caso haja complicações, como por exemplo hemorragia significativa.

Para a realização da técnica cirúrgica referida é necessário a doente ser anestesiada, sendo os métodos e fármacos anestésicos indicados, da responsabilidade do médico anestesista.