

Informação ao Utente – Gencitabina e Capecitabina

Em que consiste o Tratamento?

Este tratamento é composto por dois medicamentos:

- Um medicamento é administrado na veia, durante uma meia hora, uma vez por semana.
- O outro são comprimidos que vai fazer em casa. Inicia os comprimidos no dia em que é administrado o medicamento na veia. Toma durante 14 dias.

Como tomar os comprimidos?

Deve tomar os comprimidos duas vezes por dia:

- 30 min depois do pequeno-almoço: _____
- 30 min depois do jantar: _____

Possíveis efeitos secundários:

- Diminuição das defesas, glóbulos vermelhos e plaquetas;
- Diarreia;
- Enfraquecimento do cabelo;
- Diminuição da sensibilidade dos dedos das mãos e dos pés;
- Pele das mãos e dos pés vermelhas e secas.

Cuidados a ter:



- Vigiar sinais ou sintomas de infecção. Avaliar a temperatura corporal;
- Vigiar e referir à equipa possível aparecimento de nódos negros ou alguma perda de sangue;
- Aplicar creme hidratante várias vezes ao dia nas mãos e nos pés. Para manter a pele bem hidratada, durante a noite, pode usar luvas e meias de algodão após a aplicação do creme;
- Sempre que sair usar protector solar em todas as partes do corpo expostas ao sol;
- Evitar a exposição solar;
- Usar calçado confortável;
- Deve ingerir bastantes líquidos.

Se tiver febre, vómitos ou diarreia, entre em contacto com a equipa!

Nota: Caso não possa comparecer a algum tratamento, agradece-se contacto com o Serviço: 263 006 655.