

## Informação ao Utente – FEC

### Em que consiste o Tratamento?

Este tratamento é composto por três medicamentos diferentes (Fluoro uracilo, ciclofosfamida e epirrubicina) todos eles administrados na veia de 3 em 3 semanas.

O tratamento tem a duração de aproximadamente duas horas e meia.

### Possíveis efeitos secundários:

- Durante a administração do tratamento pode ocorrer sabor metálico, lacrimejo ou pingo no nariz;
- Durante 1 a 2 dias após a administração do tratamento a urina pode ter uma coloração avermelhada;
- Diminuição das defesas e glóbulos vermelhos do sangue (anemia);
- Náuseas;
- Vômitos;
- Diarreia;
- Mucosite;
- Queda do cabelo aproximadamente 15 dias após o 1º tratamento;
- Alterações do ciclo menstrual;
- Alteração da coloração da pele e unhas.

### Cuidados a ter:



- Vigiar sinais ou sintomas de infecção. Avaliar a temperatura corporal;
- Sempre que sair usar protector solar em todas as partes do corpo expostas ao sol;
- Evitar a exposição solar;
- Deve ingerir bastantes líquidos;
- É importante que faça uma boa higiene oral, de forma a evitar infecções da boca e prevenir ulcerações;
- Comprimidos de ondasetron.

**Se tiver febre, vômitos ou diarreia, entre em contacto com a equipa!**

**Nota:** Caso não possa comparecer a algum tratamento, agradece-se contacto com o Serviço: 263 006 655.