

## **Informação ao Utente**

### **Esvaziamento Ganglionar Cervical**

#### **O que é o Esvaziamento Ganglionar Cervical?**

O objectivo é remover os gânglios linfáticos cervicais que corram o risco de estar invadidos por células tumorais.

Existem várias técnicas cirúrgicas. A escolha da técnica a utilizar depende do tipo de tumor primário, da sua localização, das vias de drenagem linfática e do tamanho dos gânglios possivelmente invadidos.

Em casos seleccionados a radioterapia e/ou quimioterapia podem ser alternativa ao tratamento cirúrgico e frequentemente complementa-o.

#### **Que complicações podem surgir durante o procedimento?**

Normalmente a cirurgia não tem complicações. Caso ocorra alguma, as mais frequentes são:

- Complicações relacionadas com a anestesia
- Hemorragia aguda que pode implicar transfusão de sangue
- Acidentes vasculares cerebrais
- Lesões de nervos cranianos (X, XI, XII)
- Pneumotórax (raro)
- Outras lesões vasculares loco-regionais
- Em casos avançados a transfusão pode exigir traqueostomia
- Infecções
- Edema cervico-facial e do membro superior
- Défice motor do membro superior
- Dor loco-regional
- Deformidade cervical e cicatriz da área de abordagem
- Fístula

#### **Antes do procedimento, o que tenho de fazer?**

1. Jejum de pelo menos 6 horas (incluindo água) antes da cirurgia.
2. Trazer para o hospital toda a medicação que faz habitualmente (medicação para tornar o sangue mais fluido deve ser interrompida ou substituída, conforme indicação médica).
3. Trazer todos os exames complementares de diagnóstico realizados que estejam consigo.

**Nota:** Caso não possa comparecer, agradece-se contacto com os Exames Especiais: 263 006 622 ou [cirurgia.ambulatorio@hvfx.pt](mailto:cirurgia.ambulatorio@hvfx.pt)