

## Informação ao Utente

### Laringoscopia Directa e Microcirurgia Endolaríngea

#### O que é a Laringoscopia Directa e Microcirurgia Endolaríngea?

A laringoscopia directa realiza-se sob anestesia geral e consiste na introdução pela boca de um laringoscópio rígido, para explorar a laringe, através de microscópio. Durante a intervenção pode-se remover completamente lesões (pólipos, nódulos, edemas, pequenos tumores, etc) ou realizar biopsias.

A maior parte das situações clínicas que exigem esta abordagem não têm qualquer alternativa terapêutica.

#### Que complicações podem surgir durante o procedimento?

- Complicações relacionadas com a anestesia
- Equimose do lábio ou língua, o que provocará ligeiras queixas pós-operatórias, transitórias
- Lesão dos pilares anteriores amigdalinos o que pode provocar uma hemorragia intra-operatória e sequelas posteriores transitórias
- Lesão de dentes
- Insuficiência respiratória aguda que poderá implicar uma traqueostomia de urgência, para que o doente possa respirar

#### Antes do procedimento, o que tenho de fazer?

1. Jejum de pelo menos 6 horas (incluindo água) antes da cirurgia.
2. Trazer para o hospital toda a medicação que faz habitualmente (medicação para tornar o sangue mais fluido deve ser interrompida ou substituída, conforme indicação médica).
3. Trazer todos os exames complementares de diagnóstico realizados que estejam consigo.

**Nota:** Caso não possa comparecer, agradece-se contacto com os Exames Especiais: 263 006 622 ou [cirurgia.ambulatorio@hvfx.pt](mailto:cirurgia.ambulatorio@hvfx.pt)